

ワクチンデビューは生後2か月！

表のワクチンは、**0歳**に接種するワクチンです。これらは、罹ると重症化しやすく、決め手の治療法がない感染症が対象です。逆にみれば、**ワクチンで防げる病気**（VPD：vaccine preventable diseases）です。

これらのワクチンが標的にする感染症は、乳児ほど重症化しやすいものが多く、早め早めの接種が望まれます。**生後2か月から始めて、生後6か月くらいまでに**、効率よく必要回数の接種を終えて欲しいものばかりです。ワクチン接種完了まで、病気が待ってくれるとは限りませんからね。

そのためには、出産前から計画し、出産と同時に日程（**同時接種**を考慮して）を組み接種予約をすることが推奨されます。

ワクチン	種類	回数		2か月	3か月	4か月	5か月	6,7か月	8か月～	1歳
ヒブ	不活化	4回		①	②	③				④
肺炎球菌	不活化	4回		①	②	③				④
B型肝炎	不活化	3回		①	②			③		
ロタウイルス	生	2回	生後	①	②	24週まで				
		3回	6週～	①	②	③	32週まで			
四種混合	不活化	4回			①	②	③			④
BCG	生	1回					①			

○ 定期接種で推奨時期と回数

■ 定期接種で接種可能な時期

「**ワクチンデビューは生後2か月！**」に向けて、出産前から、日程の組み方、同時接種のことなど、早めに予習しておきましょう。

また、定期予防接種はお子さんの健康を守るために市町村が費用負担している事業です。わからないことや疑問点は、早めに**市町村担当部署／保健師さん**にご相談しましょう。

接種スケジュールや VPD のことなどは以下の HP を参考にしてください。

- **日本小児科学会** http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/vaccine_schedule.pdf
- **国立感染症研究所** <http://www.nih.go.jp/niid/ja/vaccine-j.html>
- **KnowVPD!** <http://www.know-vpd.jp>